

Disco cervical artificial Triadyme-C

É candidato a uma cirurgia de substituição total do disco cervical?

Poderá ser elegível para uma substituição total do disco cervical se:

- Tiver mais de 21 anos de idade
- Tiver diagnosticada uma doença degenerativa do disco cervical num ou mais níveis
- Os sintomas não melhoraram com o tratamento conservador, como repouso, fisioterapia ou medicação
- O médico recomendou uma cirurgia à coluna cervical

Se cumprir estas condições e estiver interessado, o seu médico realizará exames adicionais para confirmar se o Triadyme-C é adequado para si.

Quem não é candidato a uma cirurgia de substituição total do disco cervical?

Poderá não ser elegível para esta cirurgia se:

- Tiver determinadas deformidades da coluna vertebral perto da área cirúrgica
- Tiver doença articular grave no nível afetado
- Tiver uma infeção ativa no local da cirurgia ou no corpo
- Tiver antecedentes de osteoporose
- For alérgico aos materiais utilizados no dispositivo Triadyme-C
- Tomar medicamentos que possam interferir na cicatrização óssea
- Estiver grávida
- O médico considera que outras condições de saúde tornam esta cirurgia pouco segura

Apenas o seu médico pode determinar se esta cirurgia é adequada para si.

Riscos possíveis

Todas as cirurgias envolvem riscos. O seu médico pode explicar-lhe os riscos associados à cirurgia de substituição total do disco cervical e ao disco artificial Triadyme-C.

Se tiver alguma dúvida ou pretender obter mais informações sobre o Triadyme-C ou a cirurgia de substituição total do disco cervical, contacte o seu médico ou a respetiva equipa através de:



DYMICRON

Dimicron, Inc.
1186 South 1680 W.
Orem, UT 84058 EUA
Telefone: +1.801.221.4591
www.Dymicron.com
info@Dymicron.com

Apenas para uso experimental nos Estados Unidos.

SIGA-NOS: 



EC REP CE
0344

Representante autorizado europeu:
MT Promedt Consulting GmbH
Ernst-Heckel-Straße 7
66386 St. Ingbert,
Alemanha
Telefone: +49 6894 581020
www.mt-procons.com
info@mt-procons.com

Triadyme-C

Disco cervical artificial

Pode ser um candidato a uma cirurgia de substituição total do disco cervical com o Triadyme®-C. Fale com o seu médico para saber se esta cirurgia é adequada para si.



O Triadyme-C foi concebido para ajudar pacientes com um ou mais discos vertebrais afetados pela doença degenerativa do disco cervical (DDD).

Esta brochura destina-se a apoiar, e não a substituir, as discussões com o seu médico ou equipa de cuidados de saúde. Se tiver dúvidas sobre esta brochura, sobre o Triadyme-C ou sobre a cirurgia de substituição total do disco cervical, fale com o seu médico ou outro profissional de saúde qualificado.

Substituição total do disco cervical

O que é a doença degenerativa do disco cervical?

A doença degenerativa do disco cervical ocorre quando um ou mais discos entre os ossos do pescoço começam a desgastar-se com o tempo. Estes discos funcionam normalmente como amortecedores e permitem que o pescoço se mova com suavidade.

À medida que os discos se deterioram, as pessoas podem sentir:

- Dor ou rigidez no pescoço
- Capacidade reduzida de mover o pescoço
- Dor, formiguelo, dormência ou fraqueza que se podem estender aos ombros, braços ou mãos
- Os sintomas podem variar de pessoa para pessoa e podem agravar-se com o tempo.

Sintomas comuns

Pessoas com doença degenerativa do disco cervical podem sentir:


- Dor e rigidez no pescoço persistentes ou recorrentes
- Dor que irradia para os ombros, braços ou mãos
- Formiguelo ou dormência nos braços, mãos ou dedos
- Fraqueza que dificulta os movimentos de preensão ou precisão
- Dores de cabeça que começam no pescoço e se deslocam para a parte posterior da cabeça
- Dificuldade em rodar ou inclinar a cabeça confortavelmente

O que é a substituição total do disco cervical?

Se lhe foi diagnosticada doença do disco cervical sintomática (DDCS), a cirurgia de substituição total do disco cervical (CSTDC) pode ser uma opção.


Neste procedimento:

- O disco danificado é removido
- É substituído por um disco artificial, como Triadyme-C
- O objetivo é manter o movimento natural do pescoço



Há mais de 20 anos que os discos artificiais são utilizados em todo o mundo como alternativa à fusão da coluna. Ao contrário da fusão, que impede o movimento ao nível tratado, os discos artificiais são concebidos para permitir o movimento. A manutenção do movimento pode ajudar a reduzir a tensão nos discos adjacentes e pode reduzir o risco de problemas futuros na coluna vertebral.

COLUNA CERVICAL COM DEGENERAÇÃO DISCAL



O que é o disco cervical artificial Triadyme-C?

O Triadyme-C é um disco artificial composto por duas peças que são colocadas entre dois ossos do pescoço. A sua forma trilobada foi concebida para ajudar a manter a estabilidade da coluna, permitindo, ao mesmo tempo, o movimento natural.

As superfícies móveis são fabricadas em diamante policristalino Adymite™. Este material é muito robusto e resistente ao desgaste. Estas propriedades ajudam o disco a durar mais tempo e a continuar a funcionar em segurança ao longo do tempo.

O que acontece durante a cirurgia?

A cirurgia de substituição total do disco cervical é realizada para tratar a doença do disco cervical sintomática.

Durante o procedimento:

- É efetuada uma incisão na parte da frente do pescoço
- O disco ou discos danificados são removidos
- O Triadyme-C é colocado na coluna vertebral
- A incisão é fechada

O objetivo da cirurgia é:

- Manter o movimento natural do pescoço
- Restaurar o espaçamento adequado entre os ossos do pescoço
- Estabilizar a coluna vertebral
- Reduzir ou eliminar a dor causada pelo disco danificado

Recuperação após a cirurgia


Após a cirurgia, a maioria dos pacientes permanece no hospital durante um a dois dias.

Antes de ter alta do hospital, o seu médico pode fornecer:

- Instruções de cuidados com a incisão
- Orientações de atividade
- Um calendário de consultas de acompanhamento

A fisioterapia pode ser recomendada para ajudar a restaurar a força e o movimento do pescoço. As consultas de acompanhamento são importantes para monitorizar a cicatrização e a recuperação.

É importante seguir cuidadosamente as instruções do seu médico após a cirurgia para obter o melhor resultado possível.



Disco cervical artificial Triadyme-C

